

Die Condylusfraktur  
in diagnostischer, therapeutischer  
und prognostischer Hinsicht.

---

**INAUGURAL-DISSERTATION**

zur

Erlangung der zahnärztlichen Doktorwürde  
der

Hohen Medizinischen Fakultät  
der

Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität  
zu Bonn.

---

Vorgelegt am 24. November 1936

von

**Erna Kater**

Zahnärztin aus Essen.

---

Bonn 1936  
Anton Brand.

Gedruckt mit Genehmigung der med. Fakultät der Univ. Bonn.

Referent: Prof. Dr. Balters.

Korreferent: Prof. Dr. Proell.



*Meiner Schwester Eleonore!*



## Die Condylusfraktur in diagnostischer, therapeutischer und prognostischer Hinsicht.

Sehr umfangreich ist die Literatur über Kieferbrüche, aber nur selten sind bei ihrer Besprechung die Brüche der Gelenkfortsätze erwähnt. Von den Vorkriegsautoren sind es Schröder und Egger, die bei den Unterkieferbrüchen auch die Fraktur des Condylus berücksichtigen. So zeigt eine Statistik Eggers, die sämtliche Unterkieferfrakturen enthält, die bis 1912 in der Literatur verzeichnet waren, von 452 Fällen nur 28 Condylusfrakturen. Die Kriegsliteratur weist fast nichts hierüber auf, denn die Condylusfraktur spielt nur in Friedenszeiten eine besondere Rolle. Die Autoren der Nachkriegszeit, sowohl die ausländischen wie die deutschen, messen der Condylusfraktur eine größere Bedeutung bei.

Aus diesem Grunde auch hat mich Prof. B a l t e r s veranlaßt, die Condylenbrüche in diagnostischer, therapeutischer und prognostischer Hinsicht zusammenzustellen. Als Ausgang wähle ich eine Reihe von Fällen, die mir Prof. Balters hierzu überließ.

### Krankengeschichten.

#### Fall 1.

Drei Wochen nach erlittenem Unfall bekam Prof. Balters den Unfallverletzten E. zu Gesicht. Ein Alveolarbruch im Oberkiefer hatte zu einem Vorstand der oberen Schneidezähne und zu deren Lockerung geführt. Außerdem war der linke obere Eckzahn abgestorben. Der durch Klaffen der Zahnreihen leicht geöffnete Mund legte die Vermutung nahe, daß es sich außer dem deutlich erkennbaren Alveolarbruch auch um eine Fraktur der beiden Condylen handelte. Wie die Röntgenaufnahmen ergaben, war sowohl das linke wie auch das rechte Kieferköpfchen am Hals abgebrochen. Während das rechte Köpfchen sich nur wenig aus der Pfanne entfernte, das große Fragment sich aber gegen die Schädelbasis genähert hatte, war auf der linken Seite der Kieferkopf gedreht und vorwärts abwärts getreten.

Mit Hilfe einer Kinnfchleuder gelang es, die Zahnreihen, deren Zähne im Seitenzahnggebiet vollständig fest waren und keinerlei Zeichen von Paradentose aufwiesen, wieder in einen normalen Schluß zu bringen und nach entsprechender Übung auch in dieser Stellung zu belassen. Der Alveolarbruch wurde wie üblich behandelt, die nicht mehr zu erhaltenden Zähne entfernt und durch eine Prothese ersetzt. Der Patient konnte als klinisch geheilt entlassen werden.

### Fall 2.

Der Unfallverletzte G. war von dem Anhänger eines Lastwagens erfaßt und zu Boden geschleudert worden und hatte hierbei u. a. eine rechtsseitige Unterkiefer-Collumfraktur erlitten. Die Zahnreihen waren gesperrt, ein Kieferschluß nicht möglich. Durch sofortiges Anlegen einer Kinnfchleuder gelang es, innerhalb einiger Stunden die Zahnreihen wieder zum Schluß zu bringen und durch Ablösung der Kinnfchleuder durch einen oberen und unteren Ringschienenverband, der durch Gummizüge zusammengehalten wurde, die Abheilung der Fraktur in dieser Stellung einzuleiten. Die Zahnreihen des bereits älteren Patienten wiesen nur feste und nicht durch Paradentose geschwächte Zähne auf. Vor Ablauf der Behandlung starb der Patient, allerdings nicht infolge des erlittenen Unfalles.

### Fall 3.

Der Landwirt H. stürzte von der Scheune ab und erlitt u. a. eine beiderseitige Collumfraktur und außerdem eine Fraktur sämtlicher oberer kleinen und großen Backzähne bzw. deren Wurzeln, wie auch die Loslösung des rechten unteren Backzahnes. Die Schneidezähne und auch einzelne untere Backzähne fehlten schon vor dem Unfall. Eine Therapie wurde zunächst nicht eingeleitet. Als der Patient nach Monaten zur Begutachtung überwiesen wurde, konnten mit Hilfe des Röntgenbildes die genannten Schäden festgestellt werden. Die Kiefermitte war verschoben, zwei Zahnpaare hielten Kontakt. Da die übrigen durch die Frakturen ihren Okklusionsstand verloren hatten und auch den Kiefern keinen Halt mehr

boten, trat ein Klaffen nicht in Erscheinung. Beide Kieferköpfchen waren nur wenig in der Gelenkpfanne nach vorn verschoben, das größere Fragment aber aufwärts gezogen und in die Gelenkpfanne hinein verschoben. Die vorgenommene Therapie bestand in der Entfernung der frakturierten Zähne und in der Anfertigung zweier Ersatzstücke zur Fixierung der beiden Kiefer in der jetzigen Lage.

#### Fall 4.

B. verunglückte vor drei Monaten durch Sturz vom Fahrrad und erlitt hierbei u. a. einen linksseitigen Collumbruch. Sein Zahnsystem wies bereits größere Lücken auf, auch waren die Zähne bereits zur Hälfte ihres Knochens entblößt und gelockert. Trotz der starken Einwärtsverlagerung des gebrochenen Kieferköpfchens trat ein Klaffen der Kiefer nicht ein, wie auch eine Seitenverschiebung ausblieb. Der rechte Condylus diente als Stütze und die noch vorhandenen Zähne genügten trotz ihrer eingetretenen Lockerung, die Heilung des Bruches in normaler Bißlage eintreten zu lassen. Geringe Unterschiede konnten sich beim Zustand des Gebisses nicht zu erkennen geben.

#### Fall 5.

Der Arbeiter Sch. verunglückte durch Einquetschung bei Erdarbeiten und erlitt hierbei u. a. einen rechtsseitigen Collumbruch. Durch das Fehlen der oberen Zähne bis auf den linken Eckzahn trat dieser Bruch weniger in Erscheinung, und die Verlagerung des großen Fragmentes konnte unter Verkürzung des aufsteigenden Astes zur Abheilung kommen. Die Untersuchung zeigte nach einem Jahr außer einer Entstellung der Unterkiefermitte eine funktionelle Störung durch Beengung der Kieferöffnungsbewegung und eine beim Kauen auftretende Schmerzhaftigkeit in der rechten Gelenkgegend und oberhalb des Endes des Jochbogens. Die angefertigten Ersatzstücke hatten sich der durch die Abheilung entstandenen Kieferlage anpassen müssen. Eine Behebung der Beschwerden war wegen der seit dem Unfall verstrichenen Zeit im Erfolg versprechenden Sinne nicht möglich.

#### Fall 6.

Der Bergarbeiter L. hatte außer einer völligen Absprennung des Oberkiefers auch einen rechtsseitigen Collumbruch des Unterkiefers erfahren. Da der Patient zahnlos war, hatte man von der Hinzuziehung eines Zahnarztes Abstand genommen und die Abheilung abgewartet. Die Folge war die Einheilung des Oberkiefers in rückwärts verlagelter und seitlich gedrehter Stellung, die Verschiebung des Unterkiefers zur Bruchseite und die Annäherung desselben gegen die Gelenkgrube. Die Kieferstörungen waren dadurch aufgefallen, daß die beiden vom Patienten getragenen Ersatzstücke nicht mehr „paßten“. Die Ersatzstücke gaben die Möglichkeit der Analyse der Kiefermodelle und die Rekonstruktion im Modell. Die lange nach dem Unfall verstrichene Zeit ließ eine Therapie nicht mehr zu, doch dürfte eine sofort eingeleitete Behandlung mit Hilfe der beiden Ersatzstücke, die bei dem Unfall unverfehrt blieben und die die Kieferbeziehungen hätten wiederherstellen lassen, die später gefundene Verlagerung und die starke Beeinträchtigung des Unfallverletzten verhindert haben.

#### Fall 7.

Der Arbeiter R. verunglückte an seiner Maschine und erlitt einen linksseitigen Kieferköpfchenbruch. Der behandelnde Arzt entfernte das kleine Fragment und beließ hierbei die Therapie des Bruches. Durch die Lockerung der Zähne auf Grund einer Parodontose waren die Beziehungen der Zahnreihen zueinander gestört, das große Fragment der Kiefergrube genähert, so daß es mit seinem hinteren Ende an die rückwärtige Gelenkwand anstieß und bei der Arbeit wie auch beim Kauen Beschwerden auch im benachbarten Ohr hervorrief. Schwindelanfälle traten häufig ein und belästigten den Verletzten stark. Die Therapie konnte bei dem Zustand des Gebisses im Erfolg versprechenden Sinne nicht mehr eingeleitet werden, weshalb zunächst abwartende Haltung geboten erschien.

#### Fall 8.

Der Steinbrucharbeiter G. erlitt zwar keinen Bruch seiner Kieferköpfchen jedoch eine starke Beeinträchtigung des rechten Gelenkes und benachbarten Ohres, bei dem völlige Taubheit

eintrat, und die zu Schwindelanfällen während der Arbeit und auch während des Kauens Anlaß gab. Der schon länger zurückliegende Unfall ließ eine direkte Therapie nicht mehr zu, jedoch eine Besserung der genannten Erscheinungen durch die Anfertigung von Aufbißschielen. Die Röntgenbilder wiesen nämlich Exostosenbildungen an den Kieferköpfchen auf und außerdem die direkte Anlagerung des rechten Kieferkopfes an die Kiefergelenkwand, die auf eine Beeinträchtigung der Bandscheibe bei dem Unfall schließen ließ. Die Modellanalyse zeigte gleichzeitig ein Zurückweichen der rechten Kieferseite an den Gleitflächen der Zähne, das die genannten Erscheinungen verständlich macht.

### Fall 9.

Der Unfallverletzte H. überschlug sich mit seinem Kraftwagen zweimal und erlitt u. a. einen einseitigen Kiefergelenkbruch, der nicht zur Beobachtung kam und der als Luxation gedeutet wurde. Die Schwerhörigkeit des linken Ohres war auffällig, während das rechte Ohr Beeinträchtigungen nicht zeigte. Wie die Untersuchung des Falles ergab, war der rechte Kieferkopf gebrochen und nach außen verlagert worden, der linke Kieferkopf heil geblieben, dafür aber die hintere Gelenkwand eingebrochen. Durch Einheilen des Unterkiefers in dieser Schrägstellung kam es zu einer Entstellung des Gesichtes, zu einer Sperrung der Zahnreihen, die behelfsmäßig durch Abschleifen der Zähne ausgeglichen wurde, und zum Bestehenbleiben der linksseitigen Ohrbeschwerden. Wenn auch wegen der lang verstrichenen Zeit nach dem Unfall eine Therapie nicht mehr möglich war, so dürfte doch als feststehend gelten, daß bei sofort eingeleiteter Kieferbruchbehandlung die Schäden des Kiefergelenkbruches hätten beseitigt und die Beschwerden durch Einbruch der Gehörgangswand hätten gemildert, wenn nicht ganz behoben werden können.

In der Literatur der letzten Jahre finden sich in bezug auf die Häufigkeit der Condylusfraktur folgende Statistiken: Kri-vine (1925) stellte bei 23 Frakturlinien 10 am Gelenkkopf fest,

also 43%. Reichenbach gibt an, daß 15% aller Kieferfrakturen Gelenkkopffrakturen sind. Wassmund bezeichnet sie als tägliches Vorkommnis. Ruedi fand 27 Condylusbrüche unter 83 Unterkieferbrüchen, also 33%.

Der Häufigkeitsunterschied der Vor- und Nachkriegszeit mag zum Teil darauf beruhen, daß früher viele Condylusbrüche einfach übersehen worden sind, zumal sie oft nur geringe Dislokation aufweisen und auch vielfach mit anderen Brüchen des Unterkiefers vergesellschaftet sind. Das Röntgenbild, das sicherste diagnostische Hilfsmittel, nahm noch nicht die Stellung ein, die es heute hat. Daß die Condylusfraktur gegenwärtig häufig geworden ist, liegt sicher an der täglich wachsenden Zahl der Verkehrs-, Betriebs- und Sportsunfälle.

Die oben aufgezeichneten Fälle und die angegebenen Statistiken zeigen wohl, welche Bedeutung der Gelenkkopffraktur zukommt und wie wichtig es ist, sie bei jeder Unterkieferfraktur in Erwägung zu ziehen und eine genaue Untersuchung einzuleiten.

### Der Begriff „Condylusfraktur“ und die Ätiologie.

Was ist unter dem Begriff „Condylusfraktur“ zu verstehen? Eine Trennung des Condylus vom Ramus ascendens. Das Köpfchen kann vom Collum mandibulae absplitttern oder, was viel häufiger ist, es kommt zum Bruch im Collum selbst.

Die Condylusfrakturen können Spontan- und traumatische Frakturen sein. Spontanfrakturen sind eine Folge pathologischer Knochenbrüchigkeit, wie sie auftreten kann bei Tuberkulose, Lues, Osteomyelitis, malignen Tumoren etc., und treten in ihrer Häufigkeit weit hinter die traumatischen, die durch Gewalteinwirkung entstehen, zurück. Bei der traumatischen Fraktur unterscheidet man nun die direkte und die indirekte Fraktur. Eine direkte Fraktur ist eine Fraktur des Knochens an der Stelle, an der eine Gewalt angreift. Die direkte Condylusfraktur ist eine Seltenheit. Sie kann entstehen, wenn ein Trauma auf die Gegend etwas vor und unterhalb des Tragus oder überhaupt des aufsteigenden Astes auftritt. Ferner kommt sie im Kriege vor; indirekte Condylusbrüche sind

hier selten. Von 1000 Unterkieferfußbrüchen stellte Frey in der Wiener Poliklinik 3 indirekte Condylusbrüche fest.

Ich beschränke mich darauf, die Friedensfälle zu besprechen. Hierbei haben wir es fast ausschließlich mit der indirekten Fraktur zu tun. Darunter versteht man eine Fraktur des Knochens an einer dem Einwirkungspunkt des Traumas entfernt liegenden Stelle. Indirekte Frakturen kommen beim Gesichtschädel nur am Unterkiefer vor und zwar an den verschiedensten Stellen, so an der Symphyse, in der Caninus- und Molarengegend, am Angulus, am aufsteigenden Ast und an den Gelenkfortsätzen. Diese Stellen kann man als Prädispositionsstellen für indirekte Frakturen bezeichnen. Egger nennt sie sehr treffend „Schwachpunkte“. Solch eine Schwachpunktfraktur ist auch die indirekte Condylusfraktur, die durch eine am Corpus mandibulae angreifende Gewalt hervorgerufen wird. Die häufigsten Ursachen sind Stoß und Schlag gegen das Kinn. Wassmund betont aber deutlich, daß auch seitliche Einwirkung einen Condylusbruch herbeiführen kann. Reichenbach schließt sich dieser Behauptung an.

Wie schon erwähnt, unterscheiden sich beim Condylusbruch zwei Formen:

1. Ein Absplittern des Köpfchens vom Collum mandibulae.
2. Ein Bruch im Collum selbst, was weit häufiger ist, da das Collum wohl die schwächste Stelle des Unterkiefers ist.

Bei der ersten Form haben wir es mit einem Abscherungsbruch zu tun, d. h. eine Gewalt trifft von unten auf das Kinn auf, der Gelenkkopf findet Widerstand in der Gelenkgrube, Kraft und Gegenkraft wirken entgegengesetzt aneinander vorbei, und der Kopf wird abgesichert und zeigt eine senkrechtstehende, glatte Frakturlinie.

Bei der zweiten Form, den Collumbrüchen, lassen sich nach Wassmund drei verschiedene Frakturmöglichkeiten unterscheiden, die nach ihrem Entstehungsmechanismus und anatomischen Charakter verschieden sind:

- I. Senkrechter Collumbruch (Längsbruch).
- II. Querer Collumbruch.

### III. Schräger Collumbruch.

ad I) Der senkrechte Collumbruch ist der seltenste. Die Ursache hierfür ist Schlag gegen den Kieferwinkel senkrecht nach oben. Kraft und Gegenkraft wirken parallel entgegengesetzt, also aneinander vorbei. Es entsteht ein Längsbruch des Collums durch Abscherung. Die Bruchflächen sind glatt, der Bruchspalt verläuft frontal. Das kleine Bruchstück bleibt fast in seiner Stellung, es wird gar nicht oder nur wenig durch den *Musculus pterygoideus externus* beeinflusst.

ad II) Die queren Collumbrüche erfolgen durch Biegung, d. h. der Knochen wird über seine Elastizitätsgrenze hinaus gebogen und bricht. Bei dieser Bruchform sind vier Entstehungsmöglichkeiten zu unterscheiden:

1. Ein Trauma wirkt von vorn auf das Kinn ein, wobei die Kinngegend nach hinten gedrückt wird. Die beiden Colla biegen sich dadurch nach außen und brechen quer durch.
2. Ein Trauma wirkt von vorn und unten auf das Kinn ein. Der Unterkiefer wird dann über die Kante gebogen, die Colla biegen sich nach hinten durch und brechen in querrer Richtung.
3. Ein Trauma wirkt von der Seite auf den Kiefer ein. Das Collum der anderen Seite wird dann nach außen gebogen und bricht quer durch, vorausgesetzt aber, daß sich die Gewalt durch einen Bruch an der Stelle der Einwirkung nicht erschöpft hat.
4. Eine Seite des Unterkiefers ist fixiert. Wirkt nun ein Trauma auf die andere Seite ein, so kann das Collum dieser Seite sich nach innen biegen und quer durchbrechen.


Sämtliche queren Collumbrüche zeigen säge- oder zickzackförmige Bruchflächen. Die Dislokation der Bruchstücke kann erheblich, kann aber auch nur gering sein oder ganz fehlen, da sich die Zacken der Bruchflächen oft ineinanderkeilen und die Fragmente so fixiert werden. Ist Dislokation vorhanden, so ist, nur im Röntgenbild erkennbar, im 1. und 3. Fall das kleine Fragment nach außen, im 2. Fall nach hinten und

im 4. Fall nach innen verlagert. Ich gehe später noch näher darauf ein.

ad III) Der schräge Collumbruch ist eine Kombination von Längs- und Querbruch. Er entsteht, wenn eine starke Gewalt in Richtung auf das Kiefergelenk einer Seite das Kinn trifft. Die Kraft wirkt dann so stark, daß es auf dieser Seite nicht zur Durchbiegung sondern zum Absplittern des Köpfchens samt Collum in schräger Richtung kommt. Die Gewalt wirkt aber noch weiter und stößt den aufsteigenden Ast in Richtung auf das Gelenk nach oben, wodurch das kleine Fragment nach außen gedrückt wird und in typischer Stellung verbleibt. Auf der anderen Seite aber kommt es infolge der geringeren Gewalteinwirkung zur Durchbiegung des Collums und zum Bruch in querer Richtung. Die Bruchflächen der Schrägfraktur sind glatt und spitz zulaufend.

Die Ausführungen W a s s m u n d s hat R e i c h e n b a c h in folgender Tabelle übersichtlich zusammengestellt:

| Bruchart                     | Entstehungsmechanismus                                                                                                       | Verlauf des Bruchspaltes | Bruchfläche                  | Verlagerung des kleinen Frag-<br>mentes. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Senkrechter Col-<br>lumbruch | Abscherung durch Schlag gegen den Kieferwinkel in Richtung nach oben.                                                        | frontal                  | glatt                        | nicht wesentlich                         |
| Querer Colum-<br>bruch       | Biegung bei Gewalteinwirkung von vorn auf das Kinn oder von der Gegenseite in breiter Fläche auf den waagerechten Kieferast. | horizontal               | sägeförmig                   | nach außen<br>Abb. I                     |
|                              | Biegung bei Gewalteinwirkung von vorn unten auf das Kinn.                                                                    |                          |                              | nach hinten<br>Abb. II                   |
|                              | Biegung bei seitlicher Gewalteinwirkung auf den waagerechten Kieferast und fixierter Gegenseite.                             |                          |                              | nach innen<br>Abb. III                   |
| Schräger<br>Collumbruch      | Biegung und Abscherung zugleich bei Gewalteinwirkung gegen das Kinn mit Richtung auf das Gelenk einer Seite.                 | sagittal                 | glatt,<br>spitz<br>zulaufend | nach außen                               |



Ich will auch kurz die Einteilung der französischen Autoren Krivine und Bercher wiedergeben, die allerdings nur für sie Bedeutung hat, da sie ihre Therapie den verschiedenen Fällen anpassen. Krivine und Bercher unterscheiden drei Formen von Condylusfrakturen:

1. Typ I (Bercher) oder Fracture sous-condylienne basse (Krivine).
2. Typ II (Bercher) oder Fracture sous-condylienne haute (Krivine).
3. Typ III (Bercher) oder Fractures condyliennes complexes (Krivine).

Bei Typ I verläuft der Bruch am Grunde des Gelenkkopfes. Die Frakturlinie läuft in der Sagittalebene schräg von vorn oben nach hinten unten, in der Frontalebene von mesial oben nach lateral unten.

Bei Typ II ist die Bruchstelle direkt unter dem Gelenkköpfchen. In der Sagittalen verläuft die Bruchlinie waagerecht nach hinten, in der Frontalen ebenfalls waagerecht oder aber etwas von mesial unten nach lateral oben.

Unter Typ III fallen die Condylusfrakturen, die mit anderen Frakturen des Unterkiefers vergesellschaftet sind (Brüche des horizontalen Teiles, des anderen Gelenkkopfes etc.). Die Gelenkkopf-fraktur kann dabei dem Typ I oder Typ II entsprechen, oder aber

das Köpfchen splittert ab oder bricht im Collum in anderer Form.

Wir müssen der Einteilung W a s s m u n d s den Vorzug geben, da sie zweckmäßiger ist.

M o r a l und S c h l a m p p sprechen auch noch von einer Kompressionsfraktur des Collums mandibulae bei Fall auf das Kinn bei offenem Munde, die aber eine so seltene Ausnahme bildet, daß sich ihre Besprechung erübrigt.

Eine nicht geringere Bedeutung als die einfache Condylusfraktur hat die Fraktur mit gleichzeitiger Verrenkung (Luxationsfraktur). Statistiken der letzten Jahre zeigen, daß sie in ihrer Häufigkeit der einfachen nur wenig nachsteht, wogegen sie früher als große Seltenheit galt. Warum entsteht nun einmal die einfache Condylusfraktur und das andere Mal auch noch eine Luxation? Es gibt hier verschiedene Erklärungen. R e i c h e n b a c h glaubt, daß es, ähnlich wie bei den Luxationsfrakturen an den Gliedmaßen, zuerst zu einer Luxation und sekundär zur Fraktur kommt dadurch, daß die Gewalteinwirkung ihre Richtung ändert oder gar eine neue Gewalt auftritt. W a s s m u n d nimmt folgendes an: Ein Trauma wirkt auf das Kinn und das Collum bricht in querer Richtung. Erschöpft sich die Gewalt nicht und bleiben die spitzen Zacken der Bruchflächen verhakt, so drückt das große Fragment das Köpfchen aus der Gelenkpfanne heraus. Wird das Collum nach außen gebogen, so wird das Köpfchen nach medial luxiert, wird das Collum nach innen gebogen, so findet Luxation des Köpfchens nach vorn medial oder auch mal ganz selten nach vorn statt, letzteres besonders leicht, wenn die Fraktur bei geöffnetem Munde geschieht, also wenn das Köpfchen schon auf dem Tuberculum articulare steht. Das frakturierte Gelenkköpfchen bleibt dann in luxierter Stellung vor dem Tuberculum stehen und macht dadurch, daß der aufsteigende Ast durch die Schließmuskulatur in die leere Pfanne gezogen wird, den Eindruck, als sei es „abgerutscht (Reichenbach), und es erscheint verkleinert. Nach P e r t h e s und B o r c h e r s beruht die Luxation des frakturierten Köpfchens auf einer Zerrei-

ßung der hinteren Abschnitte der Gelenkkapsel, während bei intakter Gelenkkapsel das Köpfchen nur eine leichte Drehung erfährt. Alle Erklärungen sind stichhaltig und einleuchtend.

### **Dislokation des kleinen Fragmentes.**

(Röntgendiagnose.)

Es soll nun bei den verschiedenen Bruchformen die Dislokation des kleinen Fragmentes genauer besprochen werden. Fast alle Autoren behaupten, daß bei den Gelenkkopfbrüchen das kleine Fragment eine typische Verlagerung zeigt, nämlich nach vorn, oben und innen, hervorgerufen durch den Zug des *Musculus pterygoideus externus*, der am Collum in der Fovea pterygoidea und an der Gelenkkapsel ansetzt. W a s s m u n d betont aber, was sehr begreiflich erscheint, daß neben dem Muskelzug die Mechanik des Bruches, die Beschaffenheit der Bruchflächen und der Verlauf des Bruchspaltes zu beachten sind, die Unterschiede in der Dislokation hervorrufen. Klinisch sind diese Unterschiede nicht festzustellen, aber das Röntgenbild zeigt sie ganz deutlich. Nur bei dem senkrechten Collumbruch wird die Dislokation, wenn eine solche überhaupt vorhanden ist, allein durch den *Musculus pterygoideus externus* verursacht. Das kleine Fragment wird mehr oder weniger nach vorn, oben und innen gezogen. Anders ist es bei den queren und schrägen Collumbrüchen. Bei den queren Brüchen kommt es, je nach der Einwirkung des Traumas, zu einer Biegung nach außen, innen oder hinten. Das Köpfchen bleibt in der Gelenkpfanne und das Collum verändert seine Richtung. So zeigt z. B. bei Durchbiegung nach außen die Bruchfläche nach lateral. Das kleine Fragment bleibt im allgemeinen in Dislokation stehen und zwar dadurch, daß es sich bei Durchbiegung nach außen oder hinten in der neuen Stellung mit dem großen verhakt und bei Durchbiegung nach innen durch den Zug des *Musculus pterygoideus externus*, der in gleicher Richtung wirkt und gleichzeitig nach oben und vorn zieht, in der neuen Stellung gehalten wird. Dann und wann zeigt das kleine Fragment eine Dislokation nach innen und vorn, wenn eine Durchbiegung nach außen oder hinten erfolgt war. In

diesen Fällen hat eine Verhakung der Bruchenden der Fragmente nicht stattgefunden, und der *Musculus pterygoideus externus* konnte ungehindert seine Wirkung ausüben.

Der schräge Collumbruch zeigt eine typische Dislokation. Das kleine Fragment, das durch die schräge Abscherung in eine scharfe Spitze ausläuft, wird durch das ihm nachdrängende große Fragment nach außen gedrückt, bohrt sich mit seiner scharfen Spitze in die Weichteile und hakt sich fest. Selbst der *Musculus pterygoideus externus* hat nicht die Kraft, es zurückzuziehen, und so verbleibt das kleine Fragment in dieser Dislokation auch nach Zurückfedern des großen. Diese Verhakung unterscheidet den schrägen Collumbruch sehr deutlich von dem queren. Wie schon gesagt, sind die feinen Dislokationsunterschiede nur durch die Röntgenaufnahme festzustellen.

Im Gegensatz zu diesen feinen Dislokationsunterschieden bei der einfachen Condylusfraktur stehen die oft sehr großen der Luxationsfraktur. Um genau die Lage des kleinen Fragmentes und die Art der Luxation feststellen zu können, werden von verschiedenen Autoren (z. B. Wassmund, Reichenbach) Aufnahmen in zwei zueinander senkrecht stehenden Ebenen gefordert, eine seitliche und eine sagittale (occipito-frontale). Für besondere Fälle schlägt Wassmund statt der Projektion in Richtung hinten-vorn (occipito-frontal) die in Richtung vorn-hinten vor. Die Röntgenaufnahmen verlangen gute Projektionstechnik. Nur wenn das Gelenk freiliegt und keine Verdeckung durch die Halswirbelsäule oder Verschattung durch das Jochbein stattfindet, ist die Luxation richtig zu erkennen.

Bei der seitlichen Aufnahme ist eine vorhandene Luxation oft kaum ersichtlich und wird unter Umständen sogar übersehen (Wassmund). Ist eine Luxation zu erkennen, so sieht man immer eine Verlagerung nach vorn vor das *Tuberculum articulare*. Die Verlagerung nach vorn ist aber äußerst selten und in den meisten Fällen nur scheinbar. Macht man nämlich eine Sagittal-Aufnahme, so erkennt man den Irrtum. Es findet nicht eine Verlagerung nach vorn, sondern fast immer nach mesial und verschieden weit nach

vorn statt. Neben der seitlichen Aufnahme ist, will man ganz sicher gehen, immer eine sagittale, die die Gelenke frei und ohne Überdeckung des Jochbeins zeigt, notwendig.

Das Röntgenbild läßt erkennen, daß bei der Luxationsfraktur des Condylus im allgemeinen eine Verlagerung nach mesial, dann und wann nach vorn und nur ganz selten nach lateral auftritt. Der Bruchlinienverlauf unterscheidet sich nicht von dem der einfachen Fraktur.

Wie erhält man gute Röntgenbilder?

**Die seitliche Aufnahme:** Der Röhrenfokus wird unter dem Jochbogen so der Haut angelegt, daß der Zentralstrahl durch die Incisura semilunaris geht. Die Platte muß so gerichtet sein, daß sie mit dem Zentralstrahl einen Winkel von  $90^\circ$  bildet., also genau senkrecht zu ihm steht.

**Die occipito-frontale Aufnahme:** Die Röntgenplatte wird der Stirn und Nase angelegt. Der Zentralstrahl muß senkrecht auf die Platte fallen und soll nach W a s s m u n d nicht, wie üblich, auf die Protuberantia occipitalis sondern gut einen Finger breit darunter in die Nackengrube gerichtet sein.

Auf diese Weise erhält man fast immer eine Darstellung der Gelenke ohne Überlagerung durch das Jochbein. Bei Kindern kommt es nicht selten vor, daß der große Hirnschädel den relativ kleinen Gesichtschädel verdeckt und somit die Gelenke in Richtung hinten-vorn nicht frei darzustellen sind. Für diese Fälle schlägt W a s s m u n d **die Projektion in Richtung vorn-hinten** vor: Der Patient wird auf den Rücken gelegt, der Hinterkopf angehoben (Wassmund benutzt dazu eine 8 cm dicke Zellstoffrolle), das Kinn wird stark angezogen und die Röntgenplatte horizontal gelegt. Der Zentralstrahl wird senkrecht zur Platte auf das Ende der knöchernen Nase gerichtet. Der Hirnschädel wird so zurückgeworfen und der Gesichtschädel bis in die Gelenkgruben frei projiziert.

### Klinische Diagnose.

Alle Condylusfrakturen, es ist gleich ob ohne oder mit Luxation, ergeben das gleiche klinische Bild. Das große Fragment zeigt immer gleiche Dislokation. Es wird durch den Masseter, die senkrechten Fasern des Temporalis und durch den Musculus pterygoideus internus nach oben und durch die horizontalen Fasern des Temporalis nach hinten gezogen, und gleichzeitig ziehen der Musculus mylohyoideus, geniohyoideus und digastricus es im Kinnenteil nach unten. Dadurch erfährt der Unterkiefer eine Drehung um einen Punkt, der im Molareng Gebiet zu suchen ist. Die aufeinanderstoßenden letzten Molaren der beiden Kiefer bilden das Hypomochlion eines Hebels, dessen einer Arm (Angulus und Kieferast) nach oben und hinten und dessen anderer Arm (Kieferkörper) nach unten gezogen wird. Die Folge davon ist ein Sperren der Zahnreihen im Frontzahng Gebiet, das gering oder auch ganz beträchtlich sein kann. Der offene Biß kommt sowohl bei der einseitigen wie bei der doppelseitigen Condylusfraktur vor. Es finden sich aber in bezug auf diese beiden Frakturen Unterschiede in der Dislokation. Bei der einseitigen Condylusfraktur ist das große Fragment durch die Wirkung des Musculus pterygoideus internus der gesunden Seite nach der verletzten hin verschoben und außerdem etwas nach hinten aufwärts gezogen, das Kinn erscheint nach rückwärts und abwärts gerückt. Die Mittellinien der Kiefer weichen voneinander ab, im Unterkiefer ist sie nach der verletzten Seite hin verschoben. Nur auf der kranken Seite findet feste Berührung der Molaren statt. Die doppelseitige Condylusfraktur äußert sich in einer Rückwärtsverlagerung des ganzen Unterkiefers so, daß die untere Zahnreihe wenige Millimeter bis  $1\frac{1}{2}$  cm hinter die obere tritt und die Frontzähne in Richtung auf die Rugae der Gaumenschleimhaut beißen. Die Mittellinien der Kiefer stimmen überein, und die letzten Molaren treffen auf beiden Seiten in symmetrischer Weise aufeinander auf. Sind die Frakturen der Colla verschiedenartig, z. B. Quer- und Schrägfraktur, so kann auch im Bereich der Zahnreihen eine Dislokation nach einer Seite hin auftreten und zwar nach der, auf der die Collumfraktur die stärkere Dislokation aufweist.

Bei zahnlosen Patienten und auch bei kleinen Kindern, die noch keine Milchzähne haben, ist es schwer, eine Dislokation festzustellen, ja, sie kann sehr leicht übersehen werden. In solchen Fällen ist eine Röntgenaufnahme besonders wichtig.

Die Dislokation des großen Fragmentes, die eine *Functio laesa*, eine Artikulationsstörung herbeiführt, ist das Hauptsymptom für die Diagnose, vorausgesetzt natürlich, daß sie zu erkennen ist. Hinzukommen noch die Symptome, die auch bei anderen Frakturen auftreten, Druckschmerz, Schwellung, Beweglichkeit, Krepitation. Bei Palpation der Gegend vor dem Tragus wird, wenn ein Condylusbruch vorliegt, immer Druckschmerz erzeugt. Eine Schwellung an dieser Stelle kann fehlen, gering oder stark sein. Bei passiver Bewegung des Unterkiefers nach verschiedenen Richtungen merkt man, daß der Gelenkkopf nicht mitgeht. Krepitation kann mehr oder weniger bei Bewegung des Kiefers durch den Arzt oder den Patienten selbst festgestellt werden, was allerdings erschwert ist, wenn mehrere Bruchstellen vorhanden sind. Da jede Kieferbewegung Schmerzen verursacht, versucht der Patient, sie nach Möglichkeit zu vermeiden. Ist eine Luxationsfraktur vorhanden, so kann man manchmal die leere Gelenkpfanne durch eine flache Mulde vor dem Tragus erkennen, allerdings nur dann, wenn die Schwellung nicht zu stark ist und das in die Gelenkpfanne hochgezogene große Fragment das Bild nicht verwischt.

Was das kleine Fragment anbetrifft, so glauben einige Autoren, daß durch Untersuchung mit den tastenden Fingern unter Umständen eine Dislokation festzustellen ist. Man untersucht in der Weise, daß man Zeige- und Mittelfinger der einen Hand auf die Gelenkgegend vor dem Ohr legt und die entsprechenden Finger der anderen Hand von der Mundhöhle aus vorsichtig an der Innenseite des aufsteigenden Astes hochführt, um so die Verlagerung zu fühlen. Es wird aber wohl meistens nicht gelingen, auf diese Weise die Dislokation zu erkennen.

Die aufgezählten Symptome in ihrer Gesamtheit in Verbindung mit der Anamnese werden meistens die Diagnose „Condylusfraktur“ sichern. Ob auch gleichzeitig Luxation stattgefunden hat,

kann nur mit Hilfe des Röntgenbildes festgestellt werden. Ist aber die Dislokation des großen Fragmentes nicht deutlich zu erkennen oder fehlt sie sogar (bei der Condylusfraktur kann nach Rüedi dies Symptom auch mal fehlen), dann darf man auf die gesamten anderen Symptome keine Diagnose aufbauen. Liegt die Vermutung einer Gelenkkopffraktur nahe, dann kann nur die Röntgenaufnahme entscheiden. Sie gibt überhaupt in jedem Fall den sichersten Beweis für die Richtigkeit der Diagnose. In der neueren Literatur stößt man immer wieder auf die Forderung, bei jeder Unterkieferfraktur die Kiefergelenke röntgenologisch genau zu untersuchen.

**Spätdiagnose:** Hierfür ist das sogenannte „schiefe Gesicht“, das durch Abweichen des Kiefers nach der verletzten Seite hin entsteht, ein wichtiges Symptom. Ein weiteres Merkmal ist der offene Biß im Frontzahnggebiet. Oft klagt der Patient über Schmerzen und unangenehme Geräusche in der Gelenkgegend. Auch Störungen beim Öffnen des Mundes und beim Kauen können vorhanden sein. Zur Sicherung der Diagnose ist ein Röntgenbild erforderlich.

**Differentialdiagnose:** Was ist bei dem Condylusbruch differentialdiagnostisch zu sagen? Man könnte an die Luxation des Kiefergelenks denken. Dagegen sprechen aber folgende Tatsache: Bei der Luxation löst Druck auf die Gelenkgegend keine Schmerzen aus. Bei einseitiger Luxation ist das Kinn nach der gesunden Seite hin verschoben im Gegensatz zur einseitigen Condylusfraktur. Bei der doppelseitigen Luxation ist der Unterkiefer im Gegensatz zur doppelseitigen Condylusfraktur in toto nach vorn vor die obere Zahnreihe geschoben. Bei Luxation kann der Mund nicht geschlossen, bei Gelenkkopffraktur nicht geöffnet werden.

### Komplikationen.

Wenn ich bei der Besprechung der Condylusfraktur auch näher auf die Komplikationen eingehe, tue ich es deshalb, weil sie keine Seltenheit und von nicht geringer Bedeutung sind. Bei der Gelenkkopffraktur kommt es wegen der vorwiegend indirekten Entstehung fast nie zu einer Weichteilverletzung, wodurch auch die Gefahr einer Infektion wegfällt. Ebenfalls spielen Nerven- und Ge-

fäßverletzungen kaum eine Rolle. Nicht selten aber treten andere Komplikationen auf.

Häufig ist die Condylusfraktur durch eine *Commotio cerebri* kompliziert, die durch Stoß des Gelenkköpfchens gegen die Schädelbasis verursacht wird. Es kann Erbrechen, Pulsverlangsamung, Bewußtlosigkeit, Amnesie auftreten. Die Patienten sind zu längerem Liegen verurteilt, was den Verlauf der Heilung stark beeinflusst. Der Patient ernährt sich schlecht, er unterliegt geistigen und körperlichen Depressionen und erholt sich nur langsam.

Eine wichtige Komplikation ist auch die Verletzung des Gehörganges, die hervorgerufen wird, wenn das frakturierte Gelenkköpfchen die Gelenkpfanne, die den dorsalen Teil des Köpfchens vom Knorpel des Gehörganges trennt, durchdringt. Es entsteht eine Blutung aus dem Ohr wie bei der Schädelbasisfraktur, die auch dann und wann erfolgen kann und ganz besondere Beachtung finden muß. Es ist deshalb ratsam, bei Blutung aus dem Ohr zuerst den Gehörgang zu untersuchen. Bei Verletzung des Gehörganges rührt die Blutung nicht von einer Trommelfellverletzung sondern von einer oder mehreren Fissuren der vorderen knöchernen Gehörgangswand her oder von einer gewaltsamen Trennung des knorpeligen vom knöchernen Gehörgang. Die Folge kann geringe Gehörstörung sein.

Bei Fissuren oder Frakturen der Schädelbasis und des Felsenbeines treten neben der Ohrblutung andere wichtige Symptome auf. Es sind die der Labyrinthchädigung (Ohrenlaufen, Schwerhörigkeit bis zur Taubheit), ferner die Hämatome, Liquorausfluß, unter Umständen konsekutive eitrige Meningitis. Auch kann das Trommelfell verletzt sein. Es ist also notwendig, bei Condylusbrüchen immer nach diesen wichtigen Nebenverletzungen zu fahnden. Gehörgangs- und Schädelbasisverletzungen können natürlich bei Gewalteinwirkung auf das Kinn auch auftreten, ohne daß eine Fraktur des Condylus entsteht. Der aufsteigende Ast wird nach oben gedrückt und zerstört die Gelenkpfanne. Dabei kann das Köpfchen eingekeilt bleiben, oder aber der Unterkiefer geht in seine normale Lage zurück.

Nach de Quervain können als Folge der Schädelverletzungen auch später noch Erscheinungen auftreten, Kopfschmerzen, Schwindel, Gedächtnisschwäche. Sogar ein nur durch Erschütterung geschädigtes Gehirn kann diese Symptome noch lange zeigen. Um sicher zu gehen, daß diese Symptome eine Folge des Unfalles sind, muß durch Untersuchungen genau festgestellt werden, daß der Kopfschmerz nicht durch Hirndruck, Neuralgie, Nephritis verursacht wird. Er wird durch jede Erschütterung des Körpers hervorgerufen oder verstärkt. „Der Schwindel ist zu untersuchen auf die Zeichen einer organischen Labyrinth- oder Kleinhirnläsion. Beim gewöhnlichen Schwindel nach Schädelfraktur fällt die Romberg'sche Prüfung — Stehen mit geschlossenen Augen auf beiden und auf einem Bein oder in Seiltänzerstellung (den einen Fuß vor den anderen) — negativ aus, und die Labyrinthprüfung ergibt ebenfalls ein normales Resultat. Der Patient geht trotz entgegengesetzter Behauptung völlig sicher, ohne zu fallen.“

Bei der Gedächtnisschwäche bestehen keine großen Lücken wie beim Paralytiker, sondern Vergeßlichkeit; die Orientierung ist normal. Auch kann der Patient seinen Beruf ausüben. Diese Erscheinungen können Monate bis zu zwei Jahren nach dem Unfall noch auftreten, nehmen aber in der Stärke ab.

### Therapie.

Hinsichtlich der Therapie der Condylusfraktur finden sich in der Literatur zwei Richtungen. Die Vertreter der einen, hauptsächlich sind es die französischen, englischen und amerikanischen, sehen ihr Ziel in der alten anatomischen Wiederherstellung des Kiefers durch vollkommene Immobilisation des Gelenkes mittels nicht-funktioneller Schienen. In Deutschland, wie auch in Österreich, Ungarn und der Schweiz erstrebt man in erster Linie die Wiederherstellung der Funktion und nebenbei die anatomische im zahntragenden Gebiet und benutzt dazu funktionelle Schienenverbände. Eine Ausnahme macht die Westdeutsche Kieferklinik in Düsseldorf. Hier immobilisiert man den Kiefer und wendet starre Schienung an. (Die Schienung bespreche ich später.)

Bei den Gelenkkopfbrüchen ist es in der Regel nicht möglich, das dislozierte kleine Fragment so zu reponieren, daß es seine anatomische Stellung wieder einnimmt. Die Erfahrungen zeigen, daß es gar keiner Behandlung bedarf und daß nur das große Fragment frühzeitig reponiert und retiniert werden muß. Das kleine Fragment paßt sich an, wenn auch anatomisch nicht genau, und die in falscher Richtung erfolgte Heilung stört nicht, wenn das Gesicht nicht entstellt wird und wenn das funktionelle Ergebnis gut ist, womit man fast immer rechnen kann. In der Literatur findet man hier und da den Vorschlag, eine Reposition des kleinen Fragmentes folgendermaßen zu versuchen: Eine Hand soll einen Druck auf das Kinn nach unten und nach der gefunden Seite hin ausüben, der Zeigefinger der anderen Hand soll tief in die seitliche obere Partie des Pharynx eingeführt werden und das dislozierte kleine Fragment nach oben und außen drücken. Auf diese Weise soll eine Näherung und Verhakung der Bruchenden ermöglicht werden. Die Reposition und besonders die Retention wird in den meisten Fällen nicht gelingen, und darum lassen die Autoren auf Grund ihrer guten Erfahrungen das kleine Fragment unbeeinflusst. Die chirurgische Therapie, d. h. blutige Reposition oder gar Exstirpation des frakturierten Köpfchens hat heute nur noch Bedeutung für die Luxationsfraktur. Sonst führt frühzeitige orthopädische Therapie des großen Fragmentes fast immer zu einem guten Ergebnis. Die Reposition und Retention ist desto leichter, je mehr gesunde Zähne im Ober- und Unterkiefer stehen, die die Möglichkeit einer guten dentalen Schienung gewährleisten. Im schwachbezahnten oder zahnlosen Kiefer muß prothetischer Ersatz geschaffen werden.

Wie schon erwähnt, unterscheiden sich zwei Schienungsmethoden, die nichtfunktionelle und die funktionelle. Bei der nichtfunktionellen Schienung wird das große Fragment so an den Oberkiefer fixiert, daß das Kiefergelenk immobilisiert wird. Hierzu verwendet man Ligaturendrähte, Bügel in Verbindung mit Ligaturendrähten, Metallgußschienen, die die Kauflächen der Zähne freilassen, Splints aus Metall oder Kautschuk (das sind Schienen, die beide Zahnreihen gleichzeitig erfassen und sie so gegeneinander fixieren) etc. Durch

alle diese Schienen wird der Kiefer wochenlang immobilisiert und arbeitsunfähig gemacht. Der Patient kann nicht kauen und wird nur flüssig ernährt. Die Sprache ist erschwert, die Mundhöhle kann nicht richtig sauber gehalten werden. Alle diese Nachteile geben Veranlassung, diese Therapie abzulehnen. Erstaunlich ist, daß die Westdeutsche Kieferklinik die völlige Immobilisation bis zur Konsolidation beibehält und die funktionelle Schienung ablehnt. Die Frage, ob die Immobilisation über Wochen hinaus nicht einer Ankylose Vorschub leistet, wird von einigen Autoren entschieden verneint (Bercher, Krivine), andere glauben, daß die Gefahr besteht (Rüedi, Egger, Wassmund, Jonas).

Die funktionelle Therapie besteht in einer Fixation der Fragmente durch Apparaturen, die Kieferbewegungen zulassen. Hier könnte man einwenden, daß die Kieferbewegungen auch geringe Beweglichkeit der Fragmente verursachen, die die Heilung ungünstig beeinflusst. Diese Kieferbewegungen sind aber zu gering, um Störung in der Heilung hervorzurufen und wiederum genügen sie, die Funktion aufrecht zu erhalten. Man verwendet dentale Schienen in Verbindung mit Gummizügen, vereinzelt wird noch die schiefe Ebene nach Sauer gebraucht, sehr häufige Anwendung findet die Gleitschiene nach Schröder. B a l t e r s schlägt einen einfachen Verband vor, mit dem er gute Ergebnisse erzielt hat. Ober- und Unterkiefer werden bei Okklusionsstörung zur Wiederherstellung derselben mittels einer Kopf- und Kinnkappe, die durch Gummizüge verbunden sind, fixiert. Der Verband erlaubt geringe Kieferbewegung (Öffnen). Besonders geeignet ist er bei Kindern, bei denen die Zähne nicht den nötigen Halt für intraorale Schienen bieten. Sind neben dem Gelenkkopfbruch noch andere Frakturen des Unterkiefers vorhanden, so greift auch B a l t e r s zur dentalen Schiene.

Ich will nun die anderen genannten Verbände und ihre Anwendung kurz beschreiben:

Die dentale Schienung mit intermaxillären Gummizügen: Zur Reposition und Retention des zahntragenden Fragmentes wird am Ober- und Unterkiefer je ein Labialbogen angebracht. Bei der einseitigen Condylusfraktur wird auf der gefunden Seite, bei doppel-

seitiger auf beiden Seiten ein intermaxillärer Gummizug von vorn oben nach hinten unten befestigt. Daneben sind manchmal noch vertikale Gummizüge nötig, um ein Absinken des Unterkiefers im Frontzahnggebiet zu verhindern. Die Gummizüge werden nach und nach immer mehr erleichtert. Die Kieferbewegung wird nicht gehemmt. Der Patient kann den Mund beim Sprechen, Essen und zum Reinigen öffnen, wenn auch nur mit Anstrengung. Im Verlauf der Behandlung muß die Tätigkeit des Kiefers immer mehr gesteigert werden, und somit wird die natürliche Funktion fast beibehalten und Gelenkstörungen vermieden.

Die schiefe Ebene, eine Erfindung Sauers, findet heute nur noch selten Anwendung, da ihre Stelle die Gleitschiene, deren Vorstufe sie ist, eingenommen hat. Als Notverband ist sie besser zu verwenden als die Gleitschiene, da sie leichter herzustellen und anzulegen ist. Die schiefe Ebene stellte Sauer aus einem geraden Stück Blech mit etwas umgebogenem oberem Rand her. Sie wird an einer Schiene auf der gefunden Seite im Molarenggebiet angebracht und soll durch Führung an der oberen Zahnreihe die Abweichung des großen Fragmentes nach der kranken Seite und besonders nach lingual verhindern. Die schiefe Ebene wird heute noch so verwandt oder aber besser in der Art, daß man sie den anatomischen Verhältnissen der Zähne genau anpaßt, denn ein gerades Stück Blech legt sich nicht genau der Zahnreihe an. Auf der kranken Seite wird meist noch ein Gummizug angebracht. Hauptmeyer hat seiner Zinngußschiene eine schiefe Ebene angefügt, die sich genau an die oberen Zähne anlegt und deren Konturen im Negativ zeigt, wodurch er eine bessere Führung erhält. Fehlen an der gefunden Seite die Zähne, so kann die schiefe Ebene auch auf der kranken angebracht werden, dann aber lingual an einem Lingualbogen.

Bei der Schröderschen Gleitschiene werden um beide Zahnreihen Drahtbögen gelegt. An der Oberkieferschiene wird eine Führung befestigt und an der Unterkieferschiene ein Dorn, der genau in die Führung eingreift. Führung und Dorn sollen zwischen dem 2. Prämolaren und dem 1. Molaren angebracht werden. Die Aufgabe der Gleitschiene ist, ein Abweichen des Kiefers in sagittaler und

horizontaler Richtung zu verhindern, so daß der Kiefer nur in vertikaler Richtung geöffnet und geschlossen werden kann. Meist werden gleichzeitig auch noch Gummizüge verwendet, die ein Absinken des großen Fragmentes nach unten und maximale Kieferöffnung, bei der der Dorn aus der Führung springen kann, verhindern sollen. Bei der einseitigen Condylusfraktur wird die Gleitschiene auf der gefunden Seite angebracht und die Führung im Oberkiefer und nach vorn geschlossen hergestellt. Man hat auch versucht, sie auf der kranken Seite anzubringen. Die Führung muß dann nach hinten geschlossen hergestellt werden. In beiden Fällen sind die Heilungsergebnisse gut. Bei der doppelseitigen Gelenkkopffraktur müssen auf beiden Seiten Gleitschienen angebracht werden und zwar beide mit nach hinten geschlossener Führung. Die Kurve der Gleitschiene muß dem physiologischen Öffnungszentrum konzentrisch sein. Darum soll die Gleitschiene im Gysi-Simplex-Artikulator angelegt werden. Man kann die Gleitschiene fertig kaufen. Besser ist es, sie selbst herzustellen und jedem Fall anzupassen.

Im zahnlosen oder schwach bezahnten und im parodontotischen Kiefer sind Drahtschienen nicht anzulegen, und man muß zur Kautschukplatte greifen.

Heute werden getrennte Platten für Ober- und Unterkiefer verwandt, während früher vielfach der Kautschuk-Interdentalsplint gebraucht wurde. Die Platten werden nicht mit Zähnen versehen. So stellt R ü e d i z. B. Bißwälle her, in die Führung und Dorn ein-vulkanisiert werden.

Schlammpp gibt folgenden Apparat an: Der Ober- und Unterkiefer werden mit Platten versehen, die durch Federn verbunden sind. Es werden keine Bißwälle angebracht, sondern nur im Molarengebiet schiefe Ebenen. Im Oberkiefer sind diese einwärts gerichtet und divergieren nach distal, im Unterkiefer werden sie entsprechend gestellt, so daß sie gegen die oberen schleifen. Es werden keine Bißwälle hergestellt, um die Ernährung zu erleichtern. Hier muß gesagt werden, daß die schiefen Ebenen im Molarengebiet zur Erzielung einer guten Okklusion nicht ausreichen. Eine Unterstützung im Frontzahngebiet durch Bißwälle ist erforderlich.

Die Ernährung kann durch eine Lücke im Wall stattfinden, und außerdem soll der Patient seine Kiefer gebrauchen, eine geringe Öffnung genügt schon zur Nahrungsaufnahme.



Kautschukfchiene für die Condylusfraktur im zahnlosen Kiefer  
(nach Schlapp).

Nach der Verheilung der Bruchenden muß für den zahnlosen Kiefer ein endgültiger Zahneratz angefertigt werden, mit dem funktionsfähige Bißstellung erzielt wird. Dadurch wird auch die Gefahr des Zurücksinkens der Gelenkköpfe bei Fehlen besonders der Seitenzähne, was Belastung der Gelenke bedeutet (Ansicht Steinhardts), beseitigt.

Fehlen auf der verletzten Seite die Backzähne, so wird das große Fragment, das, wie oben gesagt, durch die Wirkung der Muskeln immer nach oben und hinten gezogen wird, durch diesen noch stärker beeinträchtigt. Es wird ja nicht, wie im bezahnten Kiefer, durch das Aufeinandertreffen der Molaren des Ober- und Unterkiefers daran gehindert. Der Zug nach oben kann so stark sein, daß das große Fragment mit seinem Bruchende gegen die Gelenkpfanne stößt. Daselbe gilt, wenn vorhandene Zähne stark pyorrhoeisch sind. Sie sind, da sie locker im Kiefer stehen, nicht in der Lage, der Muskelwirkung entgegenzuarbeiten und den Unterkiefer gegen den Oberkiefer abzufangen. Therapeutisch ist so vorzugehen, daß bei Fehlen der Backzähne Ersatz geschaffen wird. Pyorrhoeische Zähne müssen durch eine Kautschukaufbißfchiene untereinander befestigt werden. Zur Wiederherstellung der Okklusion kann auch in diesen Fällen natürlich nur ein extraoraler Verband (Kinnfchleuder) an-

gewandt werden, da eine interdentale Schienung ja nicht möglich ist.

Mit Hilfe der besprochenen Apparate wird das große Fragment wieder in seine normale Stellung gebracht und gehalten, und es findet Vereinigung der Fragmente statt. Das funktionelle Resultat ist nach R e i c h e n b a c h auch dann gut, wenn statt der Konsolidierung nur eine fibröse Vereinigung zustande kommt.

Was für eine Therapie verlangt nun die Luxationsfraktur des Gelenkkopfes? Eine Gruppe von Autoren überträgt die chirurgische Therapie, wie sie bei Luxationsfrakturen an den Gliedmaßen üblich ist, auch auf den Gelenkkopf. Hierzu gehören u. a.: Wassmund, Schröder, Perthes, Lindemann, Pamperl. Eine andere Gruppe, deren Hauptvertreter Rüedi und Reichenbach sind, behandelt die Luxationsfraktur des Gelenkkopfes genau wie die einfache Fraktur, nämlich rein orthopädisch.

Die Verfechter der chirurgischen Therapie glauben und haben zum Teil die Erfahrung gemacht, daß im Anschluß an die orthopädische Behandlung, bei der eine Heilung in mehr oder weniger stark luxierter Stellung zustande kommt, beim Öffnen des Mundes eine immer deutlicher werdende Abweichung des Kiefers nach der verletzten Seite hin auftritt. Wassmund ist außerdem der Ansicht, daß unbehandelte luxierte Fragmente zur Arthritis deformans neigen. Link schließt sich dieser Ansicht an. Die Autoren halten deshalb die chirurgische Therapie für unumgänglich. Diese besteht in einer blutigen Reposition und anschließender Ruhigstellung oder in einer Exstirpation des luxierten Gelenkfragmentes und evtl. Replantation. Hat das Bruchende des großen Fragmentes eine scharfe Spitze (nach schrägem Bruch z. B.), so muß auch diese operativ entfernt werden, da sie sich in die Gelenkpfanne einbohren und so zu schweren Schädigungen führen kann.

Bei der Reposition reißt sehr oft das Köpfchen vom Musculus pterygoideus externus ab. Wassmund hat sie trotzdem versucht, weil nach seiner Ansicht das abgebrochene Köpfchen genau so gut einheilt wie ein frei transplantiertes Knochenstück einer anderen

Körperstelle. Er hat sich aber dann zur Exstirpation des luxierten Fragmentes entschlossen, da dadurch keine wesentliche Funktionsstörung zustande kommt. Der Defekt verheilt narbig, und zwischen dem großen Fragment und der Gelenkpfanne entsteht eine Pseudarthrose, die gute Beweglichkeit und Kieferöffnung zuläßt. Dann und wann hat er auch das entfernte Fragment replantiert. Neuerdings aber hat sich W a s s m u n d wieder zur Reposition und zwar in Verbindung mit der orthopädischen Behandlung entschlossen. Er geht so vor, daß er vor der Operation einen Schienenverband anlegt, der so beschaffen sein muß, daß er nach der Operation eine Drahtverfchnürung der Zahnreihen (Immobilisation) und nach vier bis fünf Wochen ohne Änderung des Verbandes die funktionelle Therapie (Anlegung von Gummizügen nach Entfernung der Ligaturen) erlaubt. Auf der gefunden Seite wird eine schiefe Ebene und auf der kranken Gummizüge zur Entlastung des Gelenkes angebracht. Nach Freilegen des Gelenkes wird das luxierte Fragment gefaßt (Wassmund gibt hierfür seine Kiefergelenkzange an) und in richtige Lage zum großen gebracht. Wassmund vereinigt nicht nur die beiden Fragmente durch eine Naht (Catgut), sondern er befestigt noch das Köpfchen mit einer Naht am Jochbogen, weil bei alleiniger Vernähung der Bruchenden durch die Muskelwirkung (*Musculus pterygoideus externus* und die des großen Fragmentes) immer eine Reluxation verursacht werden soll. Die kurze Immobilisation von vier bis fünf Wochen führt nach Wassmund nie zur Ankylose. Reißt bei der Operation der *Musculus pterygoideus externus* ab, so bedeutet das nur eine verzögerte Konsolidation, die Heilung ist nicht ausichtslos.

Für die Fälle, bei denen die Bruchenden noch in Berührung stehen und das Köpfchen noch etwas mit der Schädelbasis in Verbindung ist, was man besonders oft bei Kindern findet, schlägt auch Wassmund die orthopädische Therapie vor. Es kommt hier zur Umformung des Gelenkes und die Funktion ist gesichert.

Die Westdeutsche Kieferklinik in Düsseldorf lehnt bei der Luxationsfraktur des Gelenkkopfes die orthopädische Behandlung und auch die blutige Reposition ab. Sie fordert Exstirpation des



### Die Fixation des Gelenkkopfes bei der blutigen Reposition (nach Wassmund)

kleinen Fragmentes mit dem Diskus und evtl. Replantation. Nur damit sei eine gute Heilung zu erzielen.

Rüedi hat sich auf Grund seiner guten Erfahrungen ausnahmslos zur orthopädischen Therapie entschlossen. Reichenbach ist Verfechter dieser Therapie geworden, weil er feststellen mußte, daß sowohl die blutige Reposition wie die Exstirpation oft unbefriedigende Ergebnisse zeigen. Ein weiterer Grund ist auch die Tatsache, daß bei Operationen in der Nähe des Kiefergelenkes leicht der Nervus facialis verletzt werden kann. Der Befürchtung Wassmunds, daß ein luxiertes Fragment bei Nichtentfernung zur Arthritis deformans neigt, stellt Reichenbach folgendes entgegen: Er hat festgestellt, daß das Kiefergelenk im Gegensatz zu den Gelenken an den Extremitäten diese Neigung nicht in dem Maße besitzt. Es ist sehr stark durchblutet, wie Untersuchungen ergeben haben, und zeigt große Heilungstendenz vorausgesetzt, daß die Gelenkwalze intakt ist.

Alle diese Gründe und die eigenen guten Erfahrungen bei der orthopädischen Behandlung veranlassen Reichenbach, die chirurgische Therapie abzulehnen. Die Verheilung in luxierter Stellung gibt gute funktionelle Ergebnisse. Die Frage nach der Entstehung einer Ankylose bei Verheilung in luxierter Stellung verneinen Reichenbach und Rüedi.

Die Therapie alter, unbehandelter Fälle richtet sich nach der

Stärke der Entstellung und Funktionsstörung. Man kann versuchen, mit intermaxillären Gummizügen und Gleitschiene ein einigermaßen gutes Resultat zu erzielen. In den meisten Fällen wird aber die chirurgische Therapie unumgänglich sein. Sie besteht entweder in einer Osteotomie an der Frakturstelle oder oberhalb des Kieferwinkels oder aber in einer Refektion des Kieferköpfchens. Anschließend muß Schienung erfolgen.

Für die Therapie der Spontanfrakturen ist die Art der Erkrankung, die zur Fraktur geführt hat, von Bedeutung. Nach Möglichkeit sollte schon bei Bruchgefahr eine Schienung vorgenommen werden. Bei pathologischen Frakturen wird eine Konsolidation ausbleiben oder aber verzögert sein. Eine Frakturheilung bei Brüchen, die infolge von Neubildung, z. B. Karzinom oder Sarkom, entstanden sind, ist so gut wie ausgeschlossen. Nach Refektion treten meist Rezidive auf. Bei Tuberkulose ist fast immer Refektion des Gelenkes erforderlich, ferner konservative Behandlung. Ob endgültige Heilung eintritt, hängt von dem gleichzeitigen Auftreten der Tuberkulose an inneren Organen ab. Schienung ist immer erforderlich. Günstigere Heilungstendenz zeigt die Fraktur nach luetischer Nekrose und Osteomyelitis. Bei der luetischen Fraktur muß neben der antiluetischen Therapie eine Schienung des Kiefers, wie wir sie kennen gelernt haben, erfolgen, also eine rein orthopädische Behandlung. Bei der Fraktur infolge von Osteomyelitis müssen die auftretenden Sequester entfernt, ferner geeignete Schienung und Allgemeinbehandlung vorgenommen werden. Der abgebrochene Kopf soll nicht chirurgisch entfernt werden. Vom Periost aus bildet sich ein neues Gelenk und das abgebrochene wird als Sequester abgestoßen (Wassmund).

### **Arthritis deformans und Ankylose.**

Die arthritischen Veränderungen und die knöcherne Ankylose, auf die ich noch kurz eingehen will, da sie im Anschluß an eine Condylusfraktur möglich sind, verlangen chirurgische Behandlung. Die Arthritis deformans nach Condylusfraktur ist nach den Erfahrungen einiger Autoren (z. B. Reichenbach, Rüedi) nicht häufig.

Wassmund hat, wie schon erwähnt, arthritische Veränderungen nach Gelenkkopffrakturen mit Luxation festgestellt. Die Beobachtungen sind im allgemeinen noch nicht abgeschlossen. Die Arthritis deformans kann gering sein und auch großen Umfang annehmen. Das Gelenkköpfchen wird flacher und breiter, der Diskus zeigt Rauigkeiten und ist fransig, an der Gelenkpfanne tritt Randwucherung auf. Klinisch zeigt sich Bewegungsbeschränkung des Kiefers nach längerer Ruhe z. B. nach dem Schlafen), die immer größer wird, ferner schmerzhaftes Spannungsgefühl im Gelenk. Bei Kieferbewegung ist ein „Rucken“ zu erkennen, bei dem *A x h a u f e n* zwei Formen unterscheidet:

1. Ein intermediäres Rucken in der Mitte der Öffnungsbewegung.
  2. Ein terminales Schnappen am Ende der Öffnungsbewegung.
- Beim „intermediären Rucken“ bleibt das Köpfchen an einem Hindernis stehen und gleitet nach Überwindung desselben mit einem Ruck bis zur maximalen Mundöffnung weiter. Ist das Hindernis so groß, daß es nicht überwunden werden kann, dann ist die Mundöffnung eingeschränkt und der Kiefer weicht nach der kranken Seite hin ab.

Beim „Schnappen“ am Ende der Öffnungsbewegung, die umfangreicher als normal ausgeführt werden kann, erfolgt eine Subluxation auf das Tuberculum oder gar eine Luxation. Das Zurückgleiten ist meistens geräuschlos.

Die Arthritis deformans ist nur durch Refektion von Gelenkteilen zu beseitigen.

Die Ankylose, die eine Folge unbehandelter Condylusfrakturen sein kann, tritt im Kindesalter häufiger als bei Erwachsenen auf. Krivine sieht den Grund dafür in einer von kariösen Zähnen über dem Lymphweg sich ausbreitenden Infektion des Gelenkes. Hierdurch werden der Diskus und der Gelenkknorpel zerstört, und die entblößten Knochen stoßen aufeinander, was zur Ankylose führt. Als Folge dieser Ankylose tritt das „Vogelgesicht“ durch Verkürzung des horizontalen und aufsteigenden Astes auf. Sonst entsteht bei unbehandelten Fällen im allgemeinen die Ankylose durch me-

chanische Störungen innerhalb des Gelenkes. Auch hier ist die chirurgische Therapie unumgänglich.

### **Begutachtung Unfallverletzter.**

Über die Begutachtung Unfallverletzter äußert sich Link in seinem kürzlich erschienenen Werk „Die Unfallbegutachtung in der Zahn-Mund-Kieferheilkunde“. Er erwähnt hier die nach seiner Ansicht nicht selten auftretende Verschlimmerung oder Neuentstehung der Arthritis deformans nach Condylusbrüchen. An Hand dieser Ausführung kann man sich ein Bild über die Begutachtung im allgemeinen machen.

Da die Frage nach der Arthritis deformans im Anschluß an eine Condylusfraktur noch umstritten ist, ist schwer zu entscheiden, wie weit Verletzung und arthritische Veränderungen zusammengehören. Link glaubt, daß eine rein traumatische Arthritis des Kiefergelenkes selten ist, vielmehr wirkt ein Trauma verschlimmernd auf eine schon bestehende, klinisch latente Erkrankung. Tritt eine rein traumatische Arthritis auf, dann muß schon ein sehr starkes Trauma mit folgender starker Knorpelschädigung und Ernährungsstörung vorgelegen haben. Zuerst ist sie monartikulär und greift später auf ihre Nachbargelenke über. Die traumatische Arthritis deformans ist eine Krankheit des Alters und tritt bei Jugendlichen selten auf, da sich bei ihnen Gelenkänderungen auszugleichen vermögen. Die Frage, ob eine Fraktur des Condylus zur Verschlimmerung oder zur Entstehung einer Arthritis geführt hat, kann nur die gleich nach dem Unfall stattgefundene klinische Untersuchung und die Röntgenaufnahme beantworten.

Bei der Verschlimmerung müssen 1. die fortschreitenden und 2. die nach vorübergehenden subjektiven und objektiven Beschwerden zurückgehende unterschieden werden. Ein Fortschreiten der Erkrankung ist durch mehrere, in bestimmten Zeitabschnitten vorzunehmende Untersuchungen an den objektiven Erscheinungen festzustellen. Hierbei kann im Laufe der Zeit neben dem verletzten Gelenk durch Mehrbeanspruchung auch das gesunde arthritische Veränderungen erfahren. Die vorübergehende Verschlimmerung

macht sich durch Gelenkschmerzen, Entzündung, Erguß geltend, verschwindet nach kurzer Zeit und läßt nur die klinischen Erscheinungen zurück, die schon vor der Verletzung vorhanden waren.

Für den ersten Fall besteht Entschädigungspflicht, für den zweiten nicht. Also sind entschädigungspflichtig solche Fälle, bei denen ein Bruch nachweislich eine Schädigung oder eine Verschlimmerung bestehender Schäden, die den Patienten hindern, hervorruft. Das bezieht sich nicht nur auf die Arthritis deformans sondern auch auf alle anderen Schädigungen.

### **Prognose.**

Hinsichtlich der Prognose bei der Condylusfraktur kann allgemein gesagt werden, daß sie sehr gut ist. Es ist erstaunlich, daß eine vollkommen gute Funktion erreicht wird, auch wenn das frakturierte kleine Fragment seine anatomische Stellung nicht wieder einnimmt. Dasselbe gilt auch für die Luxationsfraktur. Prognostisch interessant ist die Feststellung, daß selten eine Ankylose und Verheilung in Pseudarthrose auftreten. Man denke daran, welche Folgen gelenknahe Brüche an anderen Körperstellen oft haben können. Die Prognose ist bei Erwachsenen und Kindern gleich gut, Voraussetzung ist natürlich immer eine frühzeitig einsetzende richtige Behandlung. Die guten prognostischen Ergebnisse zeigen sich bei der Nachuntersuchung klinisch, während eine Röntgenkontrollaufnahme Zweifel aufkommen lassen kann, weil sie teilweise anormale anatomische Verheilung erkennen läßt, besonders bei Gelenkkopf-fraktur mit Luxation. Bei den Spontanfrakturen ist die Prognose meist ungünstig.

### **Zusammenfassung.**

Zusammenfassend ist zu sagen, daß die Condylusfraktur mit und ohne Luxation sehr häufig ist und durch Gewalteinwirkung am Kieferkörper auf indirektem Wege entsteht. Bei Vorhandensein des ganzen Symptomkomplexes kann die Diagnose gestellt werden, ausschlaggebend ist aber immer das Röntgenbild. Eine Luxation des frakturierten Köpfchens ist nur mit Hilfe der Röntgen-

aufnahme festzustellen. Differentialdiagnostisch bestehen keine Schwierigkeiten. Die Therapie ist bei einfachen Condylusfrakturen, sofern sie gleich behandelt werden, eine rein orthopädische, und sie ergibt hinsichtlich der Prognose immer gute Resultate. Bei der Luxationsfraktur stehen sich die Verfechter der orthopädischen und der chirurgischen Therapie gegenüber. Beide Methoden ergeben erfahrungsgemäß zufriedenstellende Ergebnisse. Somit wird jedem überlassen sein, auf Grund seiner Erfahrungen und an Hand seiner Fälle die geeignete Therapie zu wählen. Alte Fälle verlangen meist einen chirurgischen Eingriff und zeigen dann gute Resultate. Die Spontanfraktur ist höchst selten und die Prognose mit wenigen Ausnahmen infaust.

Bei der großen Bedeutung, die der Condylusfraktur zukommt und den Schädigungen, die mit ihr verbunden sein können, ist es eigentlich nicht zu verstehen, daß sie bisher so wenig Beachtung gefunden hat. Es wäre zu begrüßen, wenn in Zukunft der Condylusfraktur in bezug auf das traumatische Geschehen und seine vielfache Auswirkung die gleiche Bedeutung wie jeder anderen Kieferfraktur zuerkannt würde.

---

Herrn Prof. Dr. Balters spreche ich für die freundliche Überlassung des Themas und seine stete Hilfsbereitschaft meinen herzlichen Dank aus.

---

### Literaturverzeichnis.

- Anspach: Über Frakturen und Luxationen. D.Z. 1936 Nr. 6, 7, 9.
- Axhausen: Das Kiefergelenkknacken und seine Behandlung. Dtsch. Z. Chirurgie 1931.
- Egger: Über die Frakturen des Unterkiefers und deren Behandlung. Diss. Zürich 1912.
- Fleischmann: Allgemeine Pathologie des Ohres. Handbuch d. Hals-Nasen-Ohrenhkl. Bd. 6 (Die Krankheiten des Gehörganges I).
- Herber: Die Frakturen der Kiefer.
- Jonas: Zur Diagnose und Therapie der Kieferfrakturen. D.Z. herausgegeben v. O. Walkhoff 1927 H. 68.
- Krohn: Die Behandlung von Fractura colli mandibulae besonders bei Kindern und die Resultate von einigen Fällen. Dtsch. Zahn-Mund-Kieferhkd. 1934, I.
- Kümmel: Verletzungen und Erkrankungen des Ohres. Handbuch d. prakt. Chirur. Bd. I. Herausgeb. von Bergmann u. Bruns.
- Link: Die Unfallbegutachtung in der Zahn-Mund-Kieferheilkunde. Sammlung Meusser, Abhandlungen aus dem Gebiet der klinischen Zahnheilkunde. Herausgegeben von Prof. Dr. Ed. Precht, Hamburg 1936, H. 26.
- Moral u. Schlammpp: Kieferbrüche. Misch: Fortschr. d. Zhlkd. Bd. III 1; V 1; VI 1; VIII 1; IX 1.
- Muck: Mechanisches Trauma. Handbuch d. Hals-Nasen-Ohrenhkd. VIII (Die Krankheiten des Gehörganges III).
- Partsch: Die chirurg. Erkrankungen d. Mundhöhle, d. Zähne u. Kiefer. Handbuch d. Zhlkd. Bd. I, 4. Aufl., herausgeb. v. Bruhn, Kantorowicz, Partsch. München 1932.
- Zur Behandlung der Unterkieferbrüche. Verhandlungen des 5. Internat. Zahnärztl. Kongr. Berlin 1909 Bd. I.
- Perthes: Über Frakturen und Luxationsfrakturen des Kieferköpfchens und ihre operative Behandlung, Archiv. f. klin. Chir. Bd. 133, 1924.
- De Quervain: Chirurgische Erkrankungen des Kopfes. Spez. chirurg. Diagnostik f. Stud. u. Ärzte. 7. Aufl.
- Reichenbach: Leitfaden der Kieferbehandlung, Leipzig 1935 (Meusser).
- Die Verrenkungsbrüche des Unterkiefergelenkkopfes. Dtsch. Zahn-Mund-Kieferheilkunde 1934, I.
- Seltene Formen der Unterkieferfrakturen. Österreich. Zeitschr. f. Stom. 1931, H. 6.
- Rüedi: Zur Klinik der Gelenkkopffrakturen des Unterkiefers. Schweiz. Monatschr. f. Zhlkd. 1928. Bd. 38 11.
- Schlammpp: Beitrag zur funktionellen Kieferbruchbehandlung. Z.R. 1927. Nr. 39.

- Schlatter: Brüche des Unterkiefers. Handbuch d. prakt. Chir. Bd. I.  
Herausgegeben von E. Bergmann u. P. v. Bruns.
- Schröder: Frakturen und Luxationen 1911.
- Schulze: Frakturen des Unterkiefers außerhalb der Zahnreihe. Korresp.  
Bl. f. Zahnärzte 1930. Nr. 3, 4, 5.
- Sonntag u. Rosenthal: Lehrbuch der Mund- und Kieferchirurgie.  
Leipzig 1930.
- Steinhardt: Die anatom.-physiolog. Verhältnisse des zahnlosen Kie-  
fers, insbesondere der Gelenke, in ihrer Beziehung zur Technik  
der Bißnahme u. künstl. Artikulation. Bericht der 72. Tagung  
d. Dtsch. Gefellsch. f. Zahn-Mund-Kieferhkl. Berlin 1935.
- Wassmund: Frakturen und Luxationen des Gesichtschädels 1927.
- Über Luxationsfrakturen des Kiefergelenkes. Dtsch. Kieferchirur-  
gie 1934, Bd. I, Heft 1.
-

## Lebenslauf.

Am 15. Juli 1910 wurde ich, Erna Kater, in Essen als Tochter der Eheleute Eduard Kater und Mathilde, geb. Hoßfeld, geboren. Vier Jahre besuchte ich die Volksschule in Essen und anschließend die Luifenschule (Lyzeum und Oberlyzeum). Ostern 1932 legte ich die Reifeprüfung ab. Ich studierte ein Semester Philologie in Köln und anschließend Zahnmedizin in Bonn. Im Wintersemester 1933/34 bestand ich die zahnärztliche Vorprüfung und im Sommersemester 1936 das zahnärztliche Staatsexamen.

